



**CORRECTOR FOLIAR  
A BASE DE MAGNESIO**

**COMPOSICION**

Mg ..... 4,6 % p/v  
N total ..... 5,5 % p/v  
Complejo de alcoholes - azúcares

**NOMBRE QUIMICO**

Complejo de Magnesio más alcoholes azucarados

**MODO DE ACCIÓN**

Fertilizante Foliar

**FABRICANTE / FORMULADOR**

ANASAC CHILE S.A

**TOXICIDAD**

Se considera no tóxico No

**ANTIDOTO**

Requiere

**PRINCIPALES CARACTERISTICAS**

**CRECITEC Mg** es un Fertilizante Foliar en base a Magnesio, Nitrógeno y Complejo alcoholes-azucars. Desde el punto de vista nutricional aporta magnesio. Con excelentes características de absorción foliar.

| RECOMENDACIONES DE USO           |               |  |                 |
|----------------------------------|---------------|--|-----------------|
| CULTIVO                          | DOSIS (L/Ha ) | OBSERVACIONES  | CARENCIA (días) |
| ARROZ                            | 1 - 2         | Realizar aplicaciones posterior al macollamiento.  | N.A.            |
| PAPA                             | 1 - 2         | Realizar aplicaciones posterior al prendimiento hasta floración.                                   | N.A.            |
| MAIZ                             | 1 - 2         | Realizar aplicaciones entre los 25 a 35 días después de la germinación.                            | N.A.            |
| LEGUMINOSAS                      | 1 - 2         | Realizar aplicaciones entre los 20 a 30 días después de la germinación.                            | N.A.            |
| CEBOLLA                          | 1 - 2         | Realizar aplicación después del prendimiento.  | N.A.            |
| HORTALIZAS                       | 1 - 2         | Realizar 2 aplicaciones durante el crecimiento activo.   | N.A.            |
| MELON, SANDIA                    | 2 - 4         | Realizar aplicaciones en crecimiento activo de guías.  | N.A.            |
| CITRICOS                         | 2 - 4         | Realizar 2 aplicaciones desde durante el crecimiento de brotes.                                    | N.A.            |
| VID                              | 2 - 4         | Realizar aplicaciones con brotes de 30cm y 60 cm. 2 a 3 aplicaciones entre bayas cuajadas y pinta. | N.A.            |
| ARANDANOS, FRAMBUESAS Y FRUTILLA | 2 - 4         | Realizar aplicaciones en crecimiento de brotes.  | N.A.            |
| PALTOS                           | 2 - 4         | Realizar 1 ó 2 aplicaciones antes de la floración.   | N.A.            |
| TOMATE, PIMIENTOS                | 2 - 4         | Realizar 2 aplicaciones durante el crecimiento vegetativo.   | N.A.            |