



BALI®

Reg. PQUA N° 1414 – SENASA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

BALI es un fungicida de contacto que actúa preventiva controlando oídio en diversos cultivos, como *Leveillula taurica* en páprika. La literatura indica que tiene efecto repelente sobre cierto grupo de insectos.

BALI está compuesto por partículas de azufre, lo que le da una mayor adherencia al follaje y buena persistencia. **BALI**, no ofrece inconvenientes en la preparación de la mezcla, pero para formar una mejor suspensión conviene diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, luego de remover bien y finalmente completar el volumen del tanque aplicador.

FORMULACIÓN

BALI es un fungicida formulado como gránulo s dispersables (WG), contiene 800 gramos de azufre por kilo de producto formulado.

GRUPO QUÍMICO

Inorgánicos

MODO DE ACCIÓN

BALI tiene acción de contacto y gasificante. Donde se deposita entra en contacto con el patógeno y durante su oxidación puede llegar a las proximidades, ampliando el ámbito de control. Interfiere en el metabolismo del hongo en múltiples sitios



BALI®

CUADRO DE USOS

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	P L A G A S		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	(kg/200L)	(kg/Ha)		
PÁPRIKA	Oídiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.75	1.5	3	50
VID	Oídiosis	<i>Uncinula necator</i>	0.50	-	21	N.R.
MANDARINA	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	0.75	-	-	N.R.

PC: Período de Carencia en días.

N.R.: No requiere

Gasto de agua en mandarina: 1500 - 1800 L/Ha.

LMR: Límites máximos de Residuos en ppm.

RECOMEDACIONES

- * Aplicar 1 vez por campaña por año.
- * Aplicar en forma preventiva.
- * Cuando las condiciones ambientales son favorables.
- * Aplicar en horas frescas. Evitar temperaturas mayores de 28°C y vientos mayores de 5Km/hora.
- * Evite aplicar cuando exista agua libre sobre la superficie a tratar y cuando haya probabilidad de precipitación.
- * Acondicionar el agua a un pH 5.5 – 6.0
- * Mantener la solución en constante agitación desde la preparación y durante la aplicación.

COMPATIBILIDAD

BALI puede ser usado solo o mezclas o con otros plaguicidas, ya sea para completar o reforzar las aplicaciones.



BALI®

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se aplica según las recomendaciones de esta etiqueta.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada antes de 24 horas transcurridas desde la aplicación.

SEGURIDAD

- * CORROSIVO, INFLAMABLE, no explosivo.
- * Es Ligeramente peligroso - cuidado por lo que tiene banda de seguridad de color azul.
- * Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.